Esquema Nacional de Vacunación

Edad	Vacuna		Dósis	Enfermedad que previene
Recién nacido	Tuberculosis (BCG)		Única	Meningitis tuberculosa
	Hepatitis B		De recién nacido	Hepatitis B
A los 2 meses	PENTAVALENTE	Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)	Primera	Difteria - Tos ferina - Tétanos
		Haemophilus influenzae tipo b (Hib)		Meningitis y otras enfermedades causadas por *Haemophilus influenzae* tipo b
		Hepatitis B		Hepatitis B
	Polio		Primera	Poliomielitis
	Rotavirus		Primera	Diarrea por Rotavirus
	Neumococo		Primera	Neumonía, otitis, meningitis y bacteremia
A los 4 meses	PENTAVALENTE	Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)	Segunda	Difteria - Tos ferina - Tétanos
		Haemophilus influenzae tipo b (Hib)		Meningitis y otras enfermedades causadas por *Haemophilus influenzae* tipo b
		Hepatitis B		Hepatitis B
	Polio		Segunda	Poliomielitis
	Rotavirus		Segunda	Diarrea por Rotavirus
	Neumococo		Segunda	Neumonía, otitis, meningitis y bacteremia
A los 6 meses	PENTAVALENTE	Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)	Tercera	Difteria - Tos ferina - Tétanos
		Haemophilus influenzae tipo b (Hib)		Meningitis y otras enfermedades causadas por *Haemophilus influenzae* tipo b
		Hepatitis B		Hepatitis B
	Polio		Tercera	Poliomielitis
	Influenza estacional		Primera	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza
A los 7 meses	Influenza estacional*		Segunda	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza
A los 12 meses	Sarampión - Rubeola - Paperas (SRP)		Única	Sarampión - Rubeola - Paperas
	Varicela		Única	Varicela
	Neumococo		Refuerzo	Neumonía, otitis, meningitis y bacteremia
	Hepatitis A		Única	Hepatitis A
A los 18 meses	Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)		Primer refuerzo	Difteria - Tos ferina - Tétanos
	Polio		Primer refuerzo	Poliomielitis
	Fiebre amarilla (FA)		Única	Fiebre amarilla
A los 5 años	Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)		Segundo refuerzo	Difteria - Tos ferina - Tétanos
	Polio		Segundo refuerzo	Poliomielitis
	Sarampión - Rubeola - Paperas (SRP)		Refuerzo	Sarampión - Rubeola - Paperas
Niñas escolarizadas de cuarto grado de básica primaria y no escolarizadas que hayan cumplido 9 años	Virus del Papiloma Humano (VPH)		Primera: Fecha elegida	Cáncer de cuello uterino
			Segunda: 6 meses después de la primera dosis	
			Tercera: 60 meses después de la primera dosis	
Mujeres en edad fértil (MEF) entre los 10 y 49 años	Toxoide tetánico y diftérico del adulto (Td)**		5 dosis: Td1: dosis inicial Td2: al mes de Td1 Td3: a los 6 meses de Td2 Td4: al año de la Td3 Td5: al año de la Td4 Refuerzo: cada diez años	Difteria - Tétanos - Tétanos neonatal
Gestantes	Infl uenza estacional		Una dosis a partir de la semana 14 de gestación	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la infl uenza
	TdaP (Tétanos - Difteria - Tos ferina Acelular)		Dosis única a partir de la semana 26 de gestación en cada embarazo	Tétanos neonatal - Difteria - Tos ferina al recién nacido

- * Aplicar una dosis de refuerzo de infl uenza estacional entre los 12 y 23 meses de edad.
- ** De acuerdo al antecendente vacunal.

Niños y niñas con esquema tardío de vacunación

Entre 12 a 23 meses sin antecedente vacunal:

- 1 dosis de BCG si pertenece a población indígena o rural dispersa.
- 3 dosis de Polio con intervalo de 4 semanas.
- 1 dosis de pentavalente.
- Se completa con:
  - 2 dosis de DPT con intervalo de 4 semanas.
  - 2 dosis de Hepatitis B con intervalo de 4 semanas.
- 1 dosis de triple viral.
- 1 dosis de fi ebre amarilla.
- 1 dosis de hepatitis A.
- 1 dosis de varicela (si nació a partir del 1ro de julio de 2014).
- 2 dosis de neumococo con un intervalo de 2 meses.

Niños con esquema de vacunación incompleto:

- Revisar, continuar y completar el esquema según sea el caso.

Entre 2 a 5 años sin antecedente vacunal:

- 1 dosis de BCG si pertenece a población indígena o rural dispersa.
- 3 dosis de Polio con intervalo de 4 semanas.
- 3 dosis de DPT con intervalo de 4 semanas. Completar esquema con los 2 refuerzos respectivos con DPT o Td pediátrico según sea el caso.
- 3 dosis de Hepatitis B con intervalo de 4 semanas.
- 1 dosis de SRP y el refuerzo a los 5 años de edad (mínimo un año entre dosis y refuerzo).
- 1 dosis de fi ebre amarilla.
- 1 dosis de hepatitis A (si nació a partir del 1ro de enero del 2012).
- 1 dosis de neumococo.
- 1 dosis de varicela (si nació a partir del 1ro de Julio del 2014).

Niños con esquema de vacunación incompleto:

- Revisar, continuar y completar el esquema según sea el caso.

Tomado de: www.minsalud.gov.co - Actualizado a Enero 2016

promes@ de un futuro mejor

Un proyecto realizado por:

SGR Sistema General de Regalías · ruta n Medellín · Universidad CES · CANAL U · Parque de la Vida · Universidad de Antioquia · Facultad de Medicina · Facultad Nacional de Salud Pública · Alcaldía de Medellín Cuenta con vos · Gobernación de Antioquia Piensa en Grande

Co-financiado con recursos del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.
Macroproyecto "Desarrollo de soluciones en CTI para Telesalud en el Departamento de Antioquia". Convenio específico 140C-2014